

FORXIGA® HAS TWO NEW INDICATIONS¹

1

ADD-ON COMBINATION IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND CARDIOVASCULAR (CV) RISK FACTORS OR ESTABLISHED CV DISEASE:

FORXIGA (dapagliflozin) is indicated as an adjunct to diet, exercise, and standard of care therapy to reduce the risk of hospitalization for heart failure in adults with T2D mellitus and CV risk factors or established CV disease.

2

HEART FAILURE:

FORXIGA is indicated in adults, as an adjunct to standard of care therapy, for the treatment of heart failure with reduced ejection fraction (HFrEF) to reduce the risk of CV death, hospitalization for heart failure and urgent heart failure visit.


READ ABOUT THESE NEW INDICATIONS IN THE FORXIGA PRODUCT MONOGRAPH (JUNE 29, 2020).

↓ **CLICK HERE** ↓

DOWNLOAD THE FORXIGA PRODUCT MONOGRAPH AT FORXIGA.CA

FORXIGA is also indicated in monotherapy for use as an adjunct to diet and exercise to improve glycemic control in adult patients with type 2 diabetes mellitus for whom metformin is inappropriate due to contraindications or intolerance; and in adult patients with type 2 diabetes mellitus to improve glycemic control in add-on combination with metformin, a sulfonylurea, metformin and a sulfonylurea, sitagliptin (alone or with metformin) or insulin (alone or with metformin), when metformin alone or the existing therapy listed above, along with diet and exercise, does not provide adequate glycemic control.¹

Please consult the Product Monograph at www.azinfo.ca/forxiga/pm367 for contraindications, warnings and precautions, adverse reactions, drug interactions dosing and conditions of clinical use. The Product Monograph is also available by calling 1-800-668-6000.


Pr **forxiga**[®]
(dapagliflozin)

CV: cardiovascular; HFrEF: heart failure with reduced ejection fraction; T2D: type 2 diabetes

REFERENCE: 1. FORXIGA Product Monograph. AstraZeneca Canada Inc. June 29, 2020.

FORXIGA® and the AstraZeneca logo are registered trademarks of AstraZeneca AB, used under license by AstraZeneca Canada Inc.

MEMBER OF
INNOVATIVE MEDICINES CANADA

PAAB

© 2020 AstraZeneca Canada Inc.
CA-3255E

AstraZeneca 

Confidentiality Notice: This message may contain confidential, proprietary and legally privileged information. If you have received this message in error, please notify us and remove it from your system. Any unauthorized use or disclosure of the contents of this message is not permitted and may be unlawful.

FORXIGA® A DEUX NOUVELLES INDICATIONS¹

1

TRAITEMENT D'ASSOCIATION D'APPOINT POUR LES PATIENTS ATTEINTS DE DIABÈTE DE TYPE 2 PRÉSENTANT DES FACTEURS DE RISQUE CARDIOVASCULAIRES OU UNE MALADIE CARDIOVASCULAIRE ÉTABLIE :

FORXIGA (dapagliflozine) est indiqué comme traitement d'appoint à un régime alimentaire, à l'exercice et au traitement de référence en vue de réduire le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque chez les adultes atteints de diabète de type 2 et présentant des facteurs de risque CV ou une maladie CV établie.

2

INSUFFISANCE CARDIAQUE :

FORXIGA est indiqué chez les adultes comme traitement d'appoint au traitement de référence de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite (ICFER) en vue de réduire le risque de décès d'origine cardiovasculaire (CV), d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque et de consultation urgente liée à l'insuffisance cardiaque.

DÉCOUVREZ CES NOUVELLES INDICATIONS DANS LA MONOGRAPHIE DE FORXIGA (29 JUIN 2020).

↓ CLIQUEZ ICI ↓

TÉLÉCHARGEZ LA MONOGRAPHIE DE FORXIGA AU FORXIGA.CA

FORXIGA est aussi indiqué en monothérapie comme traitement d'appoint à un régime alimentaire et à l'exercice en vue d'améliorer l'équilibre glycémique chez les patients adultes atteints de diabète de type 2 à qui la metformine ne convient pas en raison de contre-indications ou d'une intolérance, ainsi que chez les patients adultes atteints de diabète de type 2 en vue d'améliorer l'équilibre glycémique en association avec la metformine, une sulfonilurée, la metformine et une sulfonilurée, la sitagliptine (seule ou avec la metformine) ou l'insuline (seule ou avec la metformine) lorsque la metformine seule ou le traitement actuel susmentionné, un régime alimentaire et l'exercice ne permettent pas d'équilibrer la glycémie de manière satisfaisante¹.

Veillez consulter la monographie du produit au www.azinfo.ca/forxiga/pm367 pour connaître les contre-indications, les mises en garde et les précautions, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et les conditions d'usage clinique. Vous pouvez aussi obtenir la monographie du produit en téléphonant au 1-800-461-3787.


Pr
forxiga
(dapagliflozine)

CV : cardiovasculaire; DT2 : diabète de type 2; ICFER : insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite

RÉFÉRENCE : 1. Monographie de FORXIGA. AstraZeneca Canada Inc., 29 juin 2020.

FORXIGA® et le logo d'AstraZeneca sont des marques déposées d'AstraZeneca AB, utilisées sous licence par AstraZeneca Canada Inc.